

Articles sur les chiroptères actuels et fossiles

AFSSA Au delà des chiffres/Un point rapide sur la rage des chauves-souris en France. BEMRAF Vol. 29

Ahlen, I. (1990) : Identification of Bats in flight. Swedish society for conservation of nature & The Swedish Youth Association for environmental studies and conservation.

Alcade, J.T. (1998) : New ecological data on the Noctule Bat in Spain. Facultad de Ciencias, Pamplona , Spain.

Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt e. V. (1997) : Zur Situation der Hufeisennasen in Europa. Tagungsband, Nebra, Deutschland 26. -28. Mai 1995

Arlettaz, R. ; Ruedi, M. & Hansser, J. (1991) : Field morphological identification of *Myotis myotis* and *Myotis blythi* a multivariate approach . *Myotis*.n°29.

Arthur, L. (1999) : Le Vespertilion à oreilles échancrées, *Myotis emarginatus*. Muséum d'histoire naturelle de Bourges.

Arthur, L. & Lemaire, M. (1991) : Etude d'impact du tracé de la rocade sur les carrières du château.

Arthur, L. & Lemaire, M. (1999) : Relation entre les ponts et les Chiroptères en dehors de la période d'hibernation dans le département du Cher. *Arvicola*.

Artois, M.. (1996) : Bulletin épidémiologique mensuel de la rage animale en France concernant la rage des Chiroptères. Laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages ; Centre Nationale d'Etudes Vétérinaires et Alimentaires.

Aulagnier, S ; Brugière, D. & Poitevin, F. (1986) : Atlas de répartition des mammifères en Auvergne. Centre ornithologique Auvergne.

Barrat, J. & Artois, M. (1997) : Un cas de rage qui ne remet pas en cause les résultats de la vaccination orale des renards. Bulletin S.F.E.P.M. n°34.

Barrat, J. & Artois, M. (1997) : Tiré à part du bulletin épidémiologique mensuel de la rage animal en France. Laboratoires d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages ; Centre National d'Etudes Vétérinaires et Alimentaires.

Bauerova, Z. (1986) : Contribution to the trophic bionomics of *Myotis emarginatus*. *Folia Zoologica*.

Beck, A, B. Stutz, H.P. & Ziswiler, V. (1989) : Das Beutespektrum der Kleinen Hufeisennase. *Revue Suisse Zool.*

Bekker, J.P. & Mostert, K. (1991) : Predation on bats in the Netherlands ; facts and assumptions. Bonn.

Bell, J.F. (1993) : Lesser Horseshoe Bats. Joint Nature Conservation Committee.

Benda, P. (1996) : Distribution of Geoffroy's bat, *Myotis emarginatus* in the levant region. *Folia Zoologica*.

Benzal, J. & De Paz O. (1991) : Los Murcielagos de Espana y Portugal. Ministerio Agricultura Pesca y Alimentation Icona

Bertrand, A. (1988) : Notes sur les chauves-souris hibernant dans les carrières souterraines de Charente-Maritime et nouvelles données sur la répartition des espèces en période d'activité. *Ann. Soc. Sci. Nat. Charente- Maritime*.

Blant, J.D. & Moeschler, P. (1986) : Nouvelles données faunistiques sur les chauves-souris du canton de Neuchâtel. *Bull. de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles*.

Blant, J.D., Leuzinger, Y. & Moeschler, P. (1986) : Présence des colonies d'élevage d'*Eptesicus nilssoni* dans le Jura suisse. *Revue Suisse de Zoologie*.

Bon, M. & Vernier, E. Una colonia di allevamento di *Vespertilio emarginato*, *Myotis emarginatus* (E. Geoffroy, 1806), in pianura veneta (Mirano, Venezia) *Mammalia Chiroptera. Lavori Soc.Ven.Sc.Nat.Vol.20. Venise/Italie*

Bradbury, J.W. & Nottebohm, F. (1969) : The use of vision by the Little Brown Bat, *Myotis lucifugus*, under controlled conditions. *Anim. Behav.*, 17, 480-485

Brasseur, J. (1995-96) : Etude par radio pistage de l'utilisation de l'espace et du temps par la Sérotine commune dans le sud de la Belgique, implications pour la conservation de l'espèce.

Brazillier, D., Duteil, D., Anisensel, F., Lemaire, M., Arthur, L. & Souchet, C. (1996) : Ponts et Chauves- Souris. *Ouvrages d' Art*.

Brosset, A. & Caubère, B. (1959) : Contribution à l'étude écologique des Chiroptères de l'ouest de la France et du bassin parisien. *Mammalia*.

Brugière, D. (1984) : Chiroptères de l'Allier et du Puy de Dôme. *Le Grand Duc*, n°25, 30-38

Calandra, V. (1985) Associazione coloniale in una nursery di *Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber) con *M.myotis* *M.emarginatus* (Geoff.) Chiroptera. Palerme.

Carroll, J.B. & Feistner, A.T.C. (1995) : Conservation of western indian ocean fruit bats. Biogéographie de Madagascar, Actes coll. Int.
Cercle d'études chiroptères : Guide pratique du Bagueur de Chauves-Souris Centre de baguage de Dijon.

Charvet, C. & Keller, A. (1989) : Une méthode douce d'identification des mammifères : la structure fine des poils. Le Rhinolophe.

Chase, J. & Suthers, R.A. (1969) : Visual obstacle avoidance by echolocating bats. Anim. Behav., 17, 201-207

Cheneval, J. (1983) : Les gisements de Saint-Gérard-Le-Puy : 150 ans de Paléontologie, 1833-1983. Revue scientifique du Bourbonnais.

Chopard, L. (1963) : Les ultrasons des chauves-souris avertissent les papillons. Revue du Palais de la Découverte.

Duvergé, L. & Jones, G. (1994) : Greater Horseshoe Bats - activity, foraging behaviour and habitat use. British Wildlife.

Dietz, C. & Braun, M. (1997) : Zur Fledermausfauna im Landkreis Freudenstadt (Regierungsbezirk Karlsruhe). *Carolinea* 55

Dietz, C.H. (2000) : Quartiernutzung von Brücken und Wasserdurchlässen durch Fledermäuse im Jahresverlauf. Universität Tübingen/Allemagne

Eger, J.L. & Mitchell, L. (1995) : Biogeography of the bats of Madagascar. Extrait de la Biogéographie de Madagascar, Actes coll. Int.

Fairon, J., Bush, E., Petit, T. & Schuiten, M. (1996) : Contribution à l'étude du problème de la cohabitation Effraies- Chiroptères. Centre de Recherche Chiroptérologique.

Fuszara, E. Kowalski, M.; Lesinski, G. & Cygan, P.J.: Hibernation of bats in the underground of central and eastern Poland

Gaisler, J. (1963) : Nocturnal activity in the Lesser Horseshoe Bat. Zool. Listy, Folia Zoologica.

Gaisler, J.V. (1971) : Zur Ökologie von *Myotis emarginatus* in Mitteleuropa. Decheniana-Beihefte n° 18.

Gaisler, J., Nesvadbova, J. & Zupal, J.: Abundance and activity of a large *Myotis emarginatus* nursery colony.

Gaucher, P. (1995) : First record of Geoffroy's Bat in Saudi Arabia. *Mammalia*, t. 59, n°1.

Glasser, J. (1983) : Connaissance et protection des chauves-souris, l'exemple de la Lorraine. *Spelunca* n° 10.

Gr. Chiropt. Poitou-Charentes-Nature (2000) / Chauves-souris du Poitou-Charentes / Atlas préliminaire 1984 à1999. Poitiers

Griffin, D.R. (1971) : The importance of atmospheric attenuation for the echolocation of bats (Chiroptera).
Anim. Behav., 19, 55-61

Grive, J. (1961) : Le mécanisme du repérage par ultrasons chez les chauves-souris. *Revue du Palais de la Découverte*.

Habersetzer, J., Richter, G., & Storch, G. (?) : Fledermäuse - bereits hoch-spezialisierte Insektenjäger.

Heidecke, H. (1997) : Colloque sur la situation de la Barbastelle en Europe. Colloque de Mansfield.

Heim de Balzac, H. (1932) : Remarques sur la note de M. Rode à propos des noctules de France. *Bull. MNHN Tome IV, N°3*. Paris

Heim de Balzac, H. (1932): Un chiroptère nouveau pour la faune française: *Nyctalus maximus* (Fatio), représenté dans les collections du Muséum. *Bull. MNHN Tome IV, N°2*. Paris

Hoff, G.L. & Bigler, W.J. (1981): The role of bats in the propagation and spread of histoplasmosis : a review. *Journal of Wildlife Diseases*. Vol.17

Hutson, A.M. (1993) : Action plan for the conservation of Bats in the United Kingdom. The Bat Conservation Trust.

Issartel, G. (2000): Contribution à une meilleure connaissance et protection des chiroptères de Martinique. SFEPM

Jay, M. & Mandrin, J.F. (1997) : Oiseaux et chauves-souris, des partenaires pour la lutte intégrée. Infos - CTIFE n° 130

Jones, G., Duvergé, L. & D. Ransome, R. (1995) : Conservation biology of an endangered species : field studies of Greater Horseshoe Bats. Zoological Symposium n°67.

Jones, G. & Rayner, J. M. V. (1989) : Foraging behavior and echolocation of wild Horseshoe Bats. Behavioral Ecology and Sociobiology.

Kervin, T., Brasseur, J. & Libois, R. (1997) : Utilisation de l'habitat par la Sérotine commune en Lorraine belge. Bull. de la Soc. Neuchâteloise des Sciences Nat.

Kiefer, A., Merz, H. & Rackow, W. (1995) : Bats as traffic casualties in Germany.

Krull, D., Schumm, A., Metzner, W. & Neuweiler, G. (1991) : Foraging areas and foraging behavior in the Notch-eared Bat. Behav. Ecol. Sociobiol.

Legendre, S. (1980) : Un Chiroptère emballonuridé dans le Néogène de l'Europe occidentale ; considérations paléobiogéographiques. Géobios, n° 13, fasc. 6, p. 839 - 847

Léger, F. (1995) : Notes sur les Chiroptères du département de l'Eure-et-Loir.

Léger, F. (1992) : Sur la présence de la Pipistrelle de Kuhl, en Eure-et-Loir, Loir-et-Cher et Sarthe. Soc. Amis Mus. Chartres Nat. Eure-et-Loir.

Léger, F. & Hamon, B. (1987) : Note sur la répartition et l'écologie hivernale de la Barbastelle en Lorraine.

Lina, P. : Les Pipistrelles de Nathusius baguées aux Pays-Bas et retrouvées en France.

Lustrat, Ph. (1990) : Meilleure saison pour capturer des Chiroptères en milieu forestier. Arvicola n°1.

Lustrat, Ph. (1996) : Nouvelles reprises de Pipistrelles de Nathusius en Ile de France. Arvicola n°9.

Lustrat, Ph. (1997) : Biais dus aux techniques d'étude des Chiroptères en activité de chasse en milieu forestier. Arvicola n°1.

Lustrat, Ph. & Julien, J.F. (1997) : Monitoring of an important hibernaculum in Paris. Myotis, Band 35.

Lustrat, Ph. (1995) : Les Chiroptères des villes de Fontainebleau et d'Avon. Bull. Assoc. Nature Vallée Loing, Vol. 71.

Lustrat, Ph. (1998) : Les chauves-souris de la Forêt de Fontainebleau. La Faune Sauvage, Bull. de l'Assoc. des amis de la Forêt de Fontainebleau.

Lustrat, Ph. (1994) : Régression des populations de Rhinolophes, (genre Rhinolophus) en Seine-et-Marne. Mammalia n°4.

Lustrat, Ph. (1997) : Répartition des Grands et Petits Rhinolophes en Seine-et-Marne. Bull. S.F.E.P.M.. n°34.

Lustrat, Ph. (1997) : Statut de la Barbastelle en Ile de France. Bull. S.F.E.P.M.. n°34.

Masson, D. : A propos des gîtes artificiels pour chauves-souris sylvoicoles.

Masson, D. & Sagot, F. (1984-1985) : Barbastelles, extrait de Groupe de Travail Chiroptères. Synthèse des observations.

Masterson, F.A. & Ellins S.E. (1973) : The role of vision in the orientation of the echolocating bat, *Myotis lucifugus* Behaviour, LI, 1-2

Mc Aney, C. & S. Fairley, J. (1988) : Habitat preference and overnight and seasonal variation in the foraging activity of Lesser Horseshoe Bats. Acta Theriologica, Vol. 33.

Mc Aney, C.M. & Fairley, J.S. (1989) : Analysis of the diet of the Lesser Horseshoe bat in the West of Ireland. J. Zool. Lond.

Mitchell-Jones, A.J. (1994) : The status and conservation of Horseshoe Bats in Britain. Myotis, Band 32.

Moeschler, P. & Blant, J.D. (1987) : Premières preuves de la reproduction de *Vespertilio murinus* L. en Suisse. Revue Suisse de Zoologie.

Morrison, D.W. (1978) : Lunar phobia in a neotropical fruit bat, *Artibeus jamaicensis* (Chiroptera : Phyllostomidae). Anim. Behav. 1978, 26, 852-855

Pailley, M. & P. (1999) : Etat des connaissances sur les chiroptères en Maine-et-Loire après douze années de recherches (hors reproduction). Crex, 1999, 4 : 63-72

Pandurska, R. Recent situation of *Rhinolophus euryale* (Blas. 1853), *R. blasii* (Peters 1866) and *R. mehelyi* (Matchie 1901) on Bulgaria.

Pandurska, R. Preferred roosts and dispersal of *Rhinolophus hipposideros* (Bechstein 1800) and *R. ferrumequinum* (Schreber 1774) in Bulgaria.

Pandurska, R. (1992) : Second record of *Tadarida teniotis* (Rafinesque, 1814) from Bulgaria. *Acta zool. Bulg.* 45.

Pandurska, R. Beshkov, V.A. (1998) : Species diversity of bats in underground roosts of the western Stara Planina Mts. (Bulgaria). *Vespert. Sofia*

Pandurska, R. (1993) : Distribution and species diversity of cave dwelling bats in Bulgaria and some remarks on the microclimatic conditions of hibernation. *Sofia*

Pénicaud, P. (1992 et 1997) : *Connaître et protéger les chauves-souris en Berry*. Indre Nature et le Muséum d'Histoire naturelle de Bourges.

Piantanida, A. (1994) : *Gestion sylvicole pour la protection des Chiroptères*. Ministère de l'Environnement, Direction générale de l'ONF.

Pir, B. J. (1997) : *Recherches appliquées à la conservation du Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum, Schreber 1774) en Lorraine*

Ransome, R. (1989) : *The natural history of hibernating bats*. Christopher Helm, London.

Renner, M. (1997) : *Historiques des connaissances des chauves-souris du Mont Saint-Quentin et ses environs*. Le Bufo.

Renner, M. (1996) : *Les chauves-souris du Lichtenberg : peut-on concilier leur maintien avec les aménagements du site ?*

Rode, P. (1932) : *A propos des noctules de France*. *Bull. MNHN Tome IV, N°3*. Paris

Rode, P. (1932) : *A propos des noctules de France (suite)*. *Bull. MNHN Tome IV, N°6*. Paris

Rollinat, R. & Trouessart, E. (1896) : *Sur la reproduction des chauves-souris*. *Mémoires de la Société Zoologique de France*.

Rollinat, R. & Trouessart, E. (1895) : *Deuxième note sur la reproduction des chiroptères*. *Comptes-rendus de la Société de Biologie*.

Rollinat, R. & Trouessart, E. (1897) : *Les Rhinolophes et note sur leurs parasites épizoïques*. *Mémoires de la Société Zoologique de France*.

Rollinat, R. & Trouessart, E. (1895) : *Sur la reproduction des chauves-souris*. *Bull. Soc. Zool. de France*.

Rollinat, R. et Trouessart, E. (1900) : *Sur le sens de la direction chez les Chiroptères*. *Mémoires de la Société biologique*.

Rollinat, R. & Trouessart, E. (1897) : Sur la reproduction des chauves-souris. Les Rhinolophes. Mémoires de la Société Zoologique de France. n°10

Roué, S. & Schwaab, F. : Répartition et statut de la Barbastelle dans la moitié Nord de la France.

Emmanuel Rousseau, L.F.: Système dentaire de la Chauves-souris commune, du hérisson ordinaire et de la taupe

Ruedi, M. & Arlettaz, R. & Maddalena, T. (1990) : Distinction morphologique et biochimique de deux espèces jumelles de chauves-souris. Mammalia n°3.

Saint-Girons, M.C. (1981) : Les Pipistrelles et la circulation routière. Mammalia n°1.

Sakalian, M. (1998) : Bulgaria biological diversity : conservation status and needs assessment . vol. 1-2 endash the bats of Bulgaria. Pensoft

Schumm, A., Krull, D., & Neuweiler, G. (1991) : Echolocation in the notch-eared bat. Behav. Ecol. Sociobiol.

Schwaab, F., Huet, R. & Pir, J. (1997) : Recherches appliquées à la conservation du grand Rhinolophe en Champagne- Ardenne et en Lorraine. Demande pour le radio- pistage sur des Grands Rhinolophes.

Sigé, B. (1968) : Les Chiroptères du Miocène inférieur de Bouzigues. Paleovertebrata.

Sigé, B. : Mammifères : Chiroptères.

Smith, P.G. (1993) : Lesser Horseshoe Bat monitoring in Wales. C.C.W. Science Report n°25.

Spitzenberg, F.V. & Bauer, K. (1987) : Die Wimperfledermaus in Österreich. Mitt. Abt. Zool..

Stebbing, R.E. : Conservation of the Greater Horseshoe Bat. British Wildlife n°2.

Suga, N. (1990) : Le système sonar des chauves-souris. Pour La Science n°154.

Suthers, R.A. & Fattu, J.M. (1973) : Fishing behaviour and acoustic orientation by the bat (*Noctilio labialis*). Anim. Behav. , 21, 61-66

Tupinier, D. : Gîtes artificiels pour chauves-souris.

Trouessart, E.L. (1892) : Histoire Naturelle de la France, 2e partie : Les Mammifères.
Musée scolaire Deyrolle.

Vergoosen, W.G. (1992): Een Kraamkamer van de ingekorven Vleemuis in midden Limburg.

Vergoosen, W.G. (1992): Une colonie de reproduction du vespertilion à oreilles échancrées dans le Limbourg central.

Vignane, J.C. (1986) : Etude d'une colonie de reproduction de Grands Murins, dans le Loiret, fin 1984 à septembre 1986. Bull. ann. Nat. Orl. , Loire moyenne.

Wilkinson, G. (1990) : Le partage du sang chez les vampires. Pour La Science n°150.

Williams, T.C. & Williams, J.M. (1970) : Radio tracking of homing and feeding flights of a neotropical bat, *Phyllostomus hastatus*. Anim. Behav., 18, 302-309

Zahn, V.A. & Henatsh, B. (1998) : Bevorzugt *Myotis emarginatus* kühlere Wochenstubenquartiere als *Myotis myotis*. Z. Säugetierkunde n°63.

Zdeněk Rehak, R.N. (1995) : Flight activity of bats in the moravian karst. Faculty of Science, Masary University in Brno.